

접촉자들을 위한 행동 수칙들

	설명	접촉자가 해야 할 행동들	간접 접촉자가 해야 할 행동들
일상 접촉자	밀접 접촉자기준에는 해당되지 않지만, 감염자 동선에 노출된 적이 있는 사람.	14 일동안, 코비드-19 증상이 나타나는지 스스로 관찰하도록 합니다 만일 증상이 나타나면, 검사를 받고, 음성 판정을 받을 때까지, 집에 머물러야 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 별다른 조치 불필요
일상 플러스 접촉자	밀접 접촉자기준에는 해당되지 않지만, 감염자 동선에 노출된 적이 있는 사람. 변이된 바이러스를 포함하여, 바이러스 전염 확률이 높은 장소에서 접촉이 있었던 경우입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 마지막 노출 후, 약 5 일째쯤 검사를 받고, 음성판정을 받을 때까지 집에 머물러야 합니다. • 14 일동안, 코비드-19 증상이 나타나는지 스스로 관찰하도록 합니다. • 만일 증상이 나타나면, 검사를 받고, 음성 판정을 받을 때까지, 집에 머물러야 합니다 	<ul style="list-style-type: none"> • 별다른 조치 불필요
밀접 접촉자	밀접 접촉자기준에 해당하며, 감염자 동선에 노출된 적이 있는 사람	<ul style="list-style-type: none"> • 마지막 노출이 있던 날로부터 14 일동안, 집이나 검역 시설에서 격리하여야 합니다. • (만일, 검사 예약이 바로 다음 날이 아니면) 바로 검사를 받고, 처음 노출 후 5 일째와, 마지막 노출 후 12 일째에 검사를 받습니다. • 만일 증상이 나타나면, 바로 추가 검사를 받습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 만일 밀접 접촉자에게 증상이 나타나면, 가구내 다른 사람들은 밀접 접촉자가 음성 판정을 받을 때까지 집에 머물러야 합니다 (증상이 시작된 후). • 만일 밀접 접촉자 가구내, 한명 또는 그 이상의 인원들에게 증상이 나타나면, 모두 집에 머물고 검사를 받아야합니다.
밀접 플러스 접촉자	밀접 플러스 접촉자의 기준은 위의 밀접 접촉자와 같습니다. 그러나 감염 위험이 더 높은 곳에서의 접촉이 있었던 경우입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 마지막 노출이 있던 날로부터 14 일동안, 집이나 검역 시설에서 격리하여야 합니다. • (만일, 검사 예약이 바로 다음 날이 아니면) 바로 검사를 받고, 처음 노출 후 5 일째에, 마지막 노출 후 12 일째에 검사를 받습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 밀접 플러스 접촉자가 5 일째 되는 날 받은 검사에서 음성 판정을 받을 때까지, 가구내 다른 모든 사람들은 집에 머물러야 합니다. • 만일 밀접 플러스 접촉자에게, 5 일째

	설명	접촉자가 해야 할 행동들	간접 접촉자가 해야 할 행동들
		<ul style="list-style-type: none"> 만일 증상이 나타나면, 바로 추가 검사를 받습니다. 	<p>검사의 음성 판정 이후 증상이 나타나면, 가구내 다른 사람들은 밀접 플러스 접촉자가 추가 검사에서 음성 판정을 받을 때까지 집에 머물러야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 만일 밀접 플러스 접촉자 가구내, 한명 또는 그 이상의 인원들에게 증상이 나타나면, 모두 집에 머물고 검사를 받아야합니다.
<p>*간접 접촉자는 밀접 또는 밀접 플러스 접촉자 가구내의 사람입니다.</p> <p>단순, 단순 플러스, 밀접, 또는 밀접 플러스 접촉자나, 밀접 또는 밀접 플러스 접촉자 가구내의 사람에게 나중에 증상이 나타나는 경우가 생기면, 그 전에 검사를 받았더라도, 다시 검사를 받아야하며, 검사 결과를 기다리는 동안에 집에 머물러야 합니다.</p> <p>코비드-19 검사가 필요하십니까? arphs.health.nz/covid19test 에 접속하십시오. 가까운 지역 검사소를 찾으실 수 있습니다.</p>			